

PRIKINSTRUCTIE FRAXIPARINE® EN FRAXODI® (NADROPARINECALCIUM)^{1,2}

VOORBEREIDING:

Was uw handen goed met water en zeep. Verwijder de spuit uit de verpakking en controleer dat:

- de uiterste houdbaarheidsdatum niet gepasseerd is
- de spuit niet beschadigd of open is.



1 Plaats van de injectie bepalen

Ga in een comfortabele positie zitten of liggen. Kies een plaats in het onderbuikgebied, ten minste 5 cm onder de navel (figuur 1), niet in de buurt van een wond. Wissel de injecties af tussen de linkerkant en de rechterkant van de onderbuik. Indien een injectie in de onderbuik niet mogelijk is, vraag dan uw verpleegkundige of uw arts om advies.



2 Het gereedmaken van de spuit

Controleer de spuit en de dosering van Fraxiparine of Fraxodi. Verwijder de naaldhuls door deze eerst te draaien en trek deze dan in een rechte lijn van de naald af (figuur 2)

⚠ LET OP: raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen voor de injectie. De kleine luchtbel in de spuit is normaal. Probeer deze niet te verwijderen voor de injectie.



3 Het inspuiten van de injectie

Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger en houd de huidplooi tussen duim en wijsvinger gedurende de gehele injectie (figuur 3).



Houd de spuit rechtop. Breng de naald in zijn geheel loodrecht (rechtstandig in een hoek van 90 graden) in de huidplooi (figuur 4). Niet opzuigen. Spuit de vloeistof langzaam in door de zuiger zo ver mogelijk naar beneden te duwen.

Het verwijderen van de injectie

Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken en de huidplooi loslaten. Niet nawrijven! Indien een bloeding zou optreden op de injectieplaats dient u enige minuten met de vingers hierop te drukken.



5 Het weggooien van de spuit

Na het toedienen van de onderhuidse injectie schuift u de beschermhuls over het spuitje (figuur 5) naar de richting van de naald totdat u "klik" hoort. De beschermhuls is nu vergrendeld en de naald afgeschermd.

⚠ LET OP: Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huishoudelijk afval. Gooi deze weg volgens instructies van uw arts of apotheker.

Dosering & behandelduur

De voorgevulde spuiten bestaan in verschillende doseringen. Uw arts zal de juiste Fraxiparine® of Fraxodi® dosis vaststellen, afhankelijk van de reden van gebruik, uw gewicht en/of u nierproblemen heeft. U moet dit middel net zo lang gebruiken als uw arts het u heeft voorgeschreven.

Heeft u teveel gebruikt?

Als u meer Fraxiparine® of Fraxodi® gebruikt dan u zou mogen, neem dan voor advies zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Bent u een dosis vergeten?

Als u Fraxiparine® of Fraxodi® een keer vergeet te gebruiken:

- Injecteer de dosering direct als u eraan denkt of wacht, als het bijna tijd is voor de volgende dosering, tot dat tijdstip.
- Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen
- Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt wat u moet doen

Fraxiparine®
natrioparinn calcium



Algemeen

085 0600 855
info@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur

Polikliniek

085 0600 853
polikliniek@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 16.30 uur

Verpleging

085 0600 854
verpleging@mkvelsen.nl

Bezoekuren

Alle dagen van
10.30 uur tot 12.00 uur en
van 14.30 uur tot 20.00 uur

Leeghwaterweg 1b | 1951 NA Velsen-Noord | www.mkvelsen.nl

