

Elektrocardioversie (ECV)

Binnenkort komt u naar onze kliniek voor een elektrocardioversie (ECV). Hieronder leest u meer over deze behandeling.

Doel

Een elektrocardioversie is een behandeling waarbij wij uw hartritme proberen te herstellen door middel van een elektrische schok.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is zeer belangrijk voor het veilig uitvoeren van een Elektrocardioversie. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande informatie goed doorneemt en u hieraan houdt.

Medicatie

3 tot 6 weken voor de Elektrocardioversie moet u medicatie slikken die uw bloed verdunnen, dit om te voorkomen dat er bloedstolsels ontstaan. Als u gebruik maakt van de Trombosedienst, dient u deze te informeren. De Trombosedienst zorgt er dan voor dat uw bloed voldoende dun is voor de behandeling.

U neemt u medicatie in volgens voorschrift ook op de dag van de behandeling, behalve als uw arts anders met u heeft afgesproken.

Nuchter

U moet voor de behandeling nuchter zijn.

Tot 6 uur voor de opname mag u nog een lichte maaltijd eten. Dit betekent een cracker of beschuit met jam, ander beleg mag niet. U mag nog wel alles drinken.

Tot 2 uur voor de opname mag u nog heldere vloeistoffen drinken. U kunt dan denken aan water, thee (evt met suiker), appelsap en aanmaaklimonade. U mag **GEEN** melk of melkproducten gebruiken.

U mag, voor het innemen van uw medicatie, een slokje water gebruiken. U dient al uw medicatie op de normale tijden in te nemen, behalve als u met uw arts andere afspraken heeft gemaakt.

Roken en het nuttigen van alcohol raden wij af 24 uur voor de behandeling.

Bent u diabetespatiënt en gebruikt u tabletten?

Neem in de ochtend geen diabetesmedicatie.

U mag na de ECV weer eten en drinken.

Bent u diabetespatiënt en spuit u insuline?

Spuut de helft van het aantal eenheden voor 7.45 uur. De andere helft kunt u na de ECV spuiten.

U mag na de ECV weer eten en drinken.

Hygiëne

Op de dag van de Elektrocardioversie mag u geen crème of bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden dragen (wij adviseren deze thuis te laten). Draagt u lenzen? Deze moeten gedurende de behandeling uit. Indien u geen bril heeft, neem dan een lensdoosje mee om uw lenzen in op te bergen.

Indien u een kunstgebit of gebitsprothese heeft, moet u deze uitdoen voor de behandeling. Neem een geschikt bakje mee waar deze in opgeborgen kan worden tijdens de behandeling.

Vervoer

U moet zelf voor vervoer zorgen. Na de behandeling mag u niet zelf autorijden of met het openbaarvervoer naar huis. Na thuiskomst mag u geen belangrijke beslissingen nemen en/of gevaarlijke apparaten bedienen.

Het onderzoek

Voor de ECV controleren wij door middel van een ECG (hartfilmpje) of de behandeling nog nodig is. Soms heeft het hartritme zich spontaan hersteld. Als u gebruik maakt van de Trombosedienst controleren wij of uw bloed voldoende dun is.

De ECV wordt uitgevoerd door de cardioloog en anesthesist.

U krijgt een infuus voor het narcosemiddel.

De anesthesist geeft u het narcosemiddel waardoor u ongeveer 10 minuten in slaap valt.

Terwijl u slaapt wordt de behandeling uitgevoerd. U merkt daar dus niets van.

Uw hartritme, ademhaling, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed worden continue in de gaten gehouden.

Risico's van het onderzoek

Een ECV kent zeer beperkte risico's. Er bestaat een kleine kans op het ontstaan van een bloedstolsel. Zo'n stolsel kan een verstopping van een bloedvat veroorzaken. Daarom is het van groot belang dat u vooraf een aantal weken medicatie gebruikt die uw bloed verdunnen.

Het lukt niet altijd om uw hartritme weer goed te krijgen. Als het de eerste keer niet lukt om uw hartritme regelmatig te krijgen, kan nog maximaal 2 keer een schok herhaald worden.

Na het onderzoek

U bent na ongeveer 15 minuten weer goed wakker. Wij verwachten dat u van de narcose weinig last heeft, soms is iemand nog wat suf of duizelig.

Wij controleren nog minimaal 1 uur uw hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte. Daarna krijgt u wat te eten en drinken. Er wordt nog een controle hartfilmpje gemaakt. Als u zich goed voelt, de controles in orde zijn en u de cardioloog heeft gesproken, mag u naar huis. Let op: **U mag niet zelf rijden.**

Soms zorgt de elektrische schok voor een rood en branderig gevoel op de huid. U kunt de plek dan insmeren met crème.

U blijft uw medicijnen innemen zoals afgesproken tot de eerstvolgende afspraak bij de cardioloog. Die beoordeelt dan of er iets veranderd moet worden.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de behandeling, neemt u dan gerust contact op met onze polikliniek cardiologie.

Tot slot

Indien u verhinderd bent neem dan uiterlijk 24 uur voor het geplande onderzoek contact met ons op, wij plannen de afspraak dan opnieuw voor u in.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 085-06 00 85



Algemeen

085 0600 855
info@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur

Polikliniek

085 0600 853
polikliniek@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 16.30 uur

Verpleging

085 0600 854
verpleging@mkvelsen.nl

Bezoekuren

Maandag t/m vrijdag van
14:30 uur tot 20:00 uur

Leeghwaterweg 1b | 1951 NA Velsen-Noord | www.mkvelsen.nl